

## Hygienemaßnahmen für den Transport von Patienten mit einem Verdacht auf eine 2019-nCoV Infektion oder bei bestätigtem Fall von der Notaufnahme (oder dem Isolierbereich) in die Radiologie

Nach Stellung eines Verdachtsfalls nach der Fall-Definition:

- Radiologie wird informiert und bereitet eine direkte Aufnahme des zu untersuchenden Patienten in den Röntgenraum vor.
- Es wird darauf geachtet, dass so wenige Flächen wie möglich durch den Patienten berührt werden. Im Falle eines CTs: die Liege wird mit flüssigkeitsundurchlässiger Einmalaufgabe ausgestattet.
- Nur ein/eine MTRA nimmt den Patienten entgegen und bereitet sich vor:
  - Händedesinfektion,
  - Schutzkittel,
  - FFP2 Maske, die sehr gut anmoduliert wird,
  - Einmalvisier (oder Einmal Schutzbrille),
  - Einmalhandschuhe.

Moduliert sich die Maske nicht gut an, wird ein Maskentyp genutzt, der sich besser anmodulieren lässt.

1. Hände desinfizieren



2. FFP2-Maske und Einmalvisier



3. Hände erneut desinfizieren



Korrekte Anlage einer FFP2 Maske und eines Einmalvisiers

- Patient wird noch im Isolierbereich mit einem chirurgischen Mundschutz versehen und desinfiziert sich die Hände.
- Medizinisches Begleitpersonal bereitet sich wie MTRA vor, begleitet den Patienten zur Radiologie und wartet vor der Radiologie, bis der Patient wieder zurück in den Isolierbereich begleitet werden kann.
- Nach Verlassen des Röntgenraums nimmt MRTA Visier und Maske sicher ab.

1. Hände desinfizieren

2. MNS abnehmen

3. Hände erneut desinfizieren



Korrektes Abnehmen der Maske. Händedesinfektion vor und nach Abnahme.

- Nach Begleitung des Patienten zurück in den Isolierbereich entsorgt das medizinische Personal Kittel und Handschuhe im Patientenvorraum.
- Danach Durchführung einer Händedesinfektion. Nach Abnahme und Abwurf der FFP2 Maske erfolgt eine weitere Händedesinfektion.

1. Hände desinfizieren



2. MNS abnehmen



3. Hände erneut desinfizieren



Korrektes Abnehmen der Maske. Händedesinfektion vor und nach Abnahme.

- Bei sehr kleinem Vorraum ist es sinnvoll, Kittel und Handschuhe im Patientenraum zu entsorgen, die FFP2 Maske (mit Händedesinfektion vor und nach Abnahme der Maske) aber erst außerhalb des Isolierbereichs.

#### **Seal-Check nach Anlage einer FFP 2 Maske:**

- tief expirieren mit aufgelegten Händen -> es sollte keine Luft an den aufliegenden Seiten bemerkbar sein
- tief inhalieren -> die Maske sollte sich eindellen

**FFP2 Masken** werden in der Notaufnahme, den Isolierbereichen und im Röntgen vorgehalten.