

Mikrobiologische Richt- und Warnwerte ENTWÜRFE – Stand April 2024

3.2 Richt- und Warnwerte für Rohwürste auf Handelsebene Entwurf einer Empfehlung 11.04.2024

		Richtwert (KbE/g)	Warnwert (KbE/g)
Enterobacteriaceae	ausgereift + schnittfest streichfähig	1 x 10 ² 1 x 10 ³	1 x 10 ³ 1 x 10 ⁴
<i>Escherichia coli</i>		1 x 10 ¹	1 x 10 ²
Koagulase-positive Staphylokokken		1 x 10 ²	1 x 10 ³
STEC		---	n.n. in 25 g
<i>Salmonella</i>		---	n.n. in 25 g
<i>Listeria monocytogenes</i> ^{a)}		---	n.n. in 25 g bzw. 1 x 10 ²

KbE: Koloniebildende Einheit

n.n.: nicht nachweisbar

^{a)} Für die Untersuchung und die Bewertung von *Listeria monocytogenes* sind die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Ergänzend hierzu können die Regelungen aus dem Art. 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 in der jeweils gültigen Fassung herangezogen werden.

Die Definitionen der Richt- und Warnwerte in der Präambel sind zu beachten!